


TETANOS QUICK STICK

Connaitre le statut vaccinal en 10 minutes !

Aide à la décision d'une prophylaxie antitétanique personnalisée

1 Libérer la lancette




Tourner (a) puis tirer (b).

A l'aide de la lancette à usage unique, piquer sur le côté de la dernière phalange (c'est à cet endroit qu'il y a le plus de sang et que cela est moins douloureux pour le patient), en évitant le pouce et l'index. Presser le doigt pour obtenir une grosse goutte de sang.

2 Piquer le doigt à l'aide de la lancette




3 Prélèvement au bout du doigt



Positionner la pipette horizontalement dans la goutte de sang.


Ne pas presser la pipette, le sang monte par capillarité jusqu'au trait noir.

4 Dépôt du sang dans le test




Pour déposer le sang, tenir la pipette verticalement, presser la poire, tout en positionnant 2 doigts au niveau du trait noir.

5 Ajout du diluant



Ajouter immédiatement (moins de 10 secondes après l'échantillon de sang) 3 gouttes de diluant en tenant le flacon verticalement.

6 10 minutes de migration



Attendre 10 minutes avant de lire le résultat.

Identification du test et traçabilité du résultat

2 étiquettes par test sont fournies dans le conditionnement TE40B.

Identification du test et du patient

Remplir une étiquette et la coller au dos du test.

Tracabilité du résultat


Remplir la deuxième étiquette (nom du patient, date, résultat du test, responsable) et la coller dans le dossier du patient.




TETANOS QUICK STICK
LOT : S-GZ-40B6041 EXP : 2010-11-30
Patient:

Date :
Res : POS NEG
Resp :

7 Lecture et interprétation



Positif : Le patient est protégé
Deux bandes colorées devant les lettres T et C



Négatif : Le patient est insuffisamment ou pas protégé
Une bande colorée devant la lettre C

La bande contrôle C doit toujours être apparente pour que le test soit validé.